

Стяжкина С.Н.,

доктор медицинских наук, профессор

Государственное федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кузнецов Е.О.,

студент 4 курса лечебного факультета

Государственное федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации

**АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРЫЖАМИ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2016-2017 ГОДА**

***Аннотация:** данная статья посвящена заболеванию пищевода. В ней рассматривается частота патологий пищевода среди населения Удмуртской республики за 2016-2017 года. Кроме того, рассматриваются частота встречаемости заболевания среди мужчин и женщин и по возрасту.*

***Ключевые слова:** грыжи пищевода, отверстия диафрагмы, лапаротомия, фундопликация по Ниссену.*

***Annotation:** this article is devoted to the disease of the esophagus. It discusses the frequency of esophageal pathologies among the population of the Udmurt Republic for the years 2016-2017. In addition, the incidence of the disease among men and women and by age are considered.*

***Key words:** hiatal hernia, laparotomy, Nissen fundoplication.*

***Актуальность:** в настоящее время грыжи пищевода (ГПОД) по частоте возникновения конкурируют со многими*

заболеваниями, например с хроническим холециститом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки [2]. ГПОД играют немаловажную роль в развитии несостоятельности нижнего пищеводного сфинктера и патологического желудочно-пищеводного рефлюкса. Кроме того, лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы является актуальной проблемой в хирургии пищевода. Причинами развития ГПОД могут являться расширение пищеводного отверстия диафрагмы, ослабление мышц, окружающих это отверстие, чрезмерно сильный кашель, рвота и подъем тяжести, способствующие повышению давления в брюшной полости [1].

Цель работы - оценить частоту встречаемости грыж пищеводного отверстия диафрагмы среди населения Удмуртской республики за 2016-2017 года, а так же определить наиболее частый оперативный метод лечения.

Материалы и методы. Было проанализировано 20 историй болезни хирургического отделения РКБ №1

Материалы и методы

Исследование проходило в Республиканской клинической больнице №1 Удмуртской республики в городе Ижевск (РКБ №1 УР г. Ижевск). Предметом нашего исследования были истории болезней хирургического отделения РКБ №1 УР г. Ижевск. Всего нами было проанализировано 20 историй болезней.

В ходе работы мы проанализировали возрастное и половое соотношение среди пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, провели сравнительную оценку за 2016-2017 года и определили наиболее частый вид оперативного лечения.

Результаты

В результате анализа 20 историй болезней с диагнозом грыжа пищеводного отверстия диафрагмы было выявлено, что соотношение заболеваемости по половому критерию составляет 1:1. (в 2016 году заболевание встречается у женщин - 44%, мужчин - 56%, в 2017 году у женщин - 45%, мужчин - 55%).



Рис. 1. Распространённость заболеваний пищевода по полу в 2016 году




Рис. 2. Распространённость заболеваний пищевода по полу в 2017 году

Наибольшая распространённость среди людей пожилого возраста- 51-60 и 61-70 лет: в 2016 году у людей в возрасте 51-60 лет - 56%, а в 61-70 – 33%, а в 2017 году у людей в возрасте 51-60 лет - 27%, а в 61-70 – 55%. Синдром дисплазии соединительной ткани наблюдался у большинства пациентов.




Рис. 3. Соотношение заболеваний пищевода по возрасту в 2016 году




Рис. 4. Соотношение заболеваний пищевода по возрасту в 2017 году

Среди оперативных методов лечения больше всего выполнялась фундопликация по Ниссену: в 2016 году- 95%, а в 2017 году- 90%.

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что грыжи пищеводного отверстия диафрагмы за 2016-2017 года в РКБ №1 УР г. Ижевск имеют тенденцию к увеличению. Наибольшее число пациентов с грыжами пищеводного отверстия

диафрагмы наблюдалось в 2017 году. С увеличением пациентов с синдромом дисплазии соединительной ткани возросла распространённость заболевания. Среди лиц мужского пола в возрасте 51-60 и 61-70 лет наблюдается уменьшение числа заболевших, а среди лиц женского пола – увеличение. Частым методом оперативного лечения является лапаротомия, фундопликация по Ниссену.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гарипов Р.М., Авзалетдинов А.М., Трофимов В.А. Варианты хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы // Вестник уральской медицинской академической науки.-2010. — № 2. — С. 89-90.
2. Трофимов В.А. Анатомическое обоснование способа хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы // Вопросы теоретической и практической медицины: матер. 75-й юбил. респуб. науч. конф. - Уфа: 2010.- С.137-138.
3. Истории болезни 1 РКБ УР.